


odra



Ostra choroba zakaźna

delikatne złuszczenie naskórka.

może mieć objawy



Szczepienie szczepionką przeciw odrze jest zalecane również:

- dorosłym, którzy nie byli szczepieni przeciw odrze w dzieciństwie,
- osobom, które w przeszłości otrzymały tylko jedną dawkę szczepionki,
- młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie).

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób wirusowych, wywoływaną przez paramyxowirusy. Prawie wszystkie nieuodpornione dzieci ulegają zakażeniu, jeśli są narażone na kontakt z wirusem. Szczepienia przeciwko odrze mają duży wpływ na ograniczenie liczby zachorowań i zgonów z powodu tej choroby na całym świecie.

Okres wylegania odrze trwa od 8 do 13 dni. Pierwszym objawem odrze jest wysoka gorączka. We wstępnej fazie choroby, osoba chora

ostrego nieżytu górnych dróg oddechowych, zapalenie spojówek ze światłowstrętem i małe plamki po wewnętrznej stronie policzków oraz na języku. Po kilku dniach w obrębie głowy pojawia się charakterystyczna plamisto-grudkowa wysypka. Przez kolejne 3 dni, zstępuje ona z głowy na tułów, a następnie na ręce i nogi. Wysypka utrzymuje się przez 3 do 7 dni, potem ustępuje, pozostawiając brunatne przebarwienia i

Wysoco zaraźliwy wirus odrze rozprzestrzenia się podczas kaszlu lub kichania, przez bliski lub bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa i gardła osoby zakażonej.

Wirus pozostaje aktywny i zakaźny w powietrzu lub na skażonych powierzchniach do 2 godzin. Może być rozprzestrzeniany przez zakażone osoby od 3 dni przed wystąpieniem wstępnych objawów nieżytowych i gorączki (5 dni przed wystąpieniem wysypki), do 3 dni od wystąpienia wysypki.

Strategie zapobiegania oraz zwalczania odrze:

1. Realizacja szczepień podstawowych – pierwsza dawka szczepionki przeciwko odrze jest podawana w Polsce dzieciom w 13-14 miesiącu życia lub krótko po. Jest to podstawa podtrzymania redukcji śmiertelności z powodu odrze. Każdego roku, w każdym regionie powinno zostać zaszczepionych co najmniej 90% dzieci.
2. Szczepienia przypominające – są przeznaczone dla wszystkich dzieci w Polsce w 10 roku życia, co zapewnia odporność przeciwko odrze u tych dzieci, które nie uzyskały odporności po szczepieniu pierwotnym (jest to ok. 15% dzieci).
3. Nadzór – obejmuje pobór próbek krwi od osób podejrzanych o zakażenie oraz ich diagnostykę w laboratoriach akredytowanych, a także szybkie rozpoznanie i dochodzenie epidemiologiczne w ogniskach odrze.
4. Poprawa opieki medycznej nad chorymi na odrę, w tym odpowiednie leczenie powikłań.

